

Insektfix este un preparat cu acțiune fizică ce formează o peliculă vâscoasă care imobilizează și elimină organismele dăunătoare. Acționează rapid într-un interval larg de temperaturi, nu lasă reziduuri, nu determină apariția rezistenței, are spectru larg de combatere, poate fi utilizat de mai multe ori în sezonul de vegetație, nu necesită perioadă de așteptare înainte de recoltare și poate crește eficiența altor produse de protecție a plantelor.

Utilizare și dozaj: Cereale: afide, cicade, trips - concentrație recomandată: 0,15–0,2% v/v (150-200 ml de produs în 100 l de apă) volum de apă recomandat: 200 l/ha. **Rapiță:** afide, gândacul polenului, gărgărițele, musculița albă de seră, purici, putregaiul rădăcinii de varză (combaterea insectelor invadatoare) - concentrație recomandată: 0,15–0,2% (150-200 ml de produs în 100 l de apă) volum de apă recomandat: 200 l/ha. **Sfeclă de zahăr:** cicadele, purici, acarieni – concentrație recomandată: 0,15–0,2% (150-200 ml de produs în 100 l de apă) volum de apă recomandat: 200 l/ha. **Cartof:** afide - concentrație recomandată: 0,15–0,2% (150-200 ml de produs în 100 l de apă) volum de apă recomandat: 200 l/ha. **Porumb:** Musca cerealelor (controlul muștelor invadatoare) -concentrație recomandată: 0,15–0,2% (150-200 ml de produs în 100 l de apă) volum de apă recomandat: 200 l/ha. **Culturi pomicole: măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic** - afide, acarieni - concentrație recomandată: 0,1–0,2% (100-200 ml produs la 100 l de apă). **Prun, măr, păr:** larve de Picioare negre – concentrație recomandată: 0,1–0,2% (100-200 ml produs la 100 l de apă). **Coacăz, zmeur, căpșun:** afide, acarieni - concentrație recomandată: 0,1–0,2% (100-200 ml produs la 100 l de apă) volum de apă recomandat: 500-700 l/ha. Poate fi aplicat de mai multe ori pe parcursul unui anumit sezon de creștere. Aplicați înainte și după înflorirea arbuștilor fructiferi. **Legume - roșii, ardei, fasole, sfeclă roșie, castravete:** afide – concentrație recomandată: 0,05–0,1% (50-100 ml produs la 100 l de apă). **Roșii, castravete și alte cucurbitacee cu semințe mari:** acarieni - concentrație recomandată: 0,2% (200 ml produs la 100 l de apă). **Varză chinezească, broccoli, conopidă :** musca albă a legumelor, concentrație recomandată: 0,1% (100 ml produs la 100 l de apă) **Plante ornamentale:** afide - concentrație recomandată 0,05– 0,1% (50-100 ml produs la 100 l de apă) Se utilizează concentrațiile mai mari în caz de infestări severe. Repetare la 14 zile dacă este necesar.

Utilizare - la apariția primilor dăunători, aplicare în afara perioadelor de activitate a albinelor pe plante uscate și neafectate. **Pregătirea soluției** - agitați flaconul, umpleți rezervorul pe jumătate cu apă, adăugați cantitatea necesară, completați cu apă. Clătiți ambalajul gol cu apă pentru a clăti rezervorul, curățați echipamentul după utilizare, păstrați flaconul bine închis datorită proprietăților de polimerizare. Precauții: respectați măsurile de siguranță, purtați echipament de protecție, producătorul nu răspunde pentru utilizarea necorespunzătoare. Depozitare și eliminare: păstrați în ambalajul original la 5–40°C în loc ventilat departe de alimente, furaje, copii și persoane neavizate. Ambalajele complet golite se elimină în siguranță.