

INSTRUCIUNI UTILIZARE

**PRODUSUL
PRODUCĂTOR**

ÎNGRĂȘĂMÂNT „AGRISOL NPK 14,5.10.15+12S”
S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

Descriere	Granule de culoare albă sau colorate, utilizate ca îngrășământ complex pentru legume
Compoziție	Azot 14.5%, Fosfor 10%, Potasiu 15%, Sulf 12%
Aspectul	granule între 2-5 mm, min. 95%; granule sub 2 mm și peste 5 mm, max. 5%;
Toxicitate	Produs lipsit practic de toxicitate EC FERTILISER conform regulamentului CE1009/2019

2. MOD DE ACȚIUNE

AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S este un îngrășământ complex, excepțional pentru fertilizarea culturilor de legume atât înainte de plantare cât și după, prin aplicare la suprafață odată cu lucrările de mobilizare a solului.

AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S are o influență benefică la culturile de legume, determinând o creștere cantitativă și calitativă a producției.

AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S asigură reglarea metabolismului plantelor, creșterea rădăcinilor și formarea fructelor.

3. MODUL DE FOLOSIRE

Când și cum aplicăm AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S?

1. AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S este un îngrășământ complex, cu un conținut ridicat de N, P și K, fiind recomandat pentru fertilizarea legumelor atât în sere, solarii cât și în câmp.

Fertilizarea plantelor se va efectua odată cu plantatul cât și fazial la anumite intervale de timp. Administrarea îngrășământului AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S se va efectua odată cu plantatul, prin împrăștierea granulelor, pe rând, după care se va proceda la încorporarea granulelor. Se administrează 10-15 g AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S/mp.

2. A doua fertilizare, fazială, se va face după 20-25 zile de la prima fertilizare. Este indicat ca această operațiune să se facă odată cu mobilizarea solului. Se administrează 10-15 g AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S/mp.

3. A treia fertilizare, fazială, se va aplica după 15-20 zile de la a doua fertilizare fazială, urmată de udarea moderată a suprafeței fertilizate. Se administrează 10-15 g AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S/mp.

FOARTE IMPORTANT!

-
- a) Pentru obținerea unor sporuri de producție ridicate, atât cantitativ cât și calitativ, se recomandă administrarea foliară a biostimulatorului ASFAC BCO-4, în două prize, doza recomandată fiind de 10 ml/100 mp/tratament.
- b) Imediat după fiecare administrare a îngrășământului AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S, se va iriga suprafața pe care s-a aplicat acesta.
- c) Nu se va aplica îngrășământul AGRISOL NPK 14,5-10-15 +12S pe zăpadă sau sol înghețat.
- d) Respectați minim 15 zile între momentele fertilizării.
-

Șef secție

Eugenia HONGU