

Informații și instrucțiuni privind utilizarea VIRUMOR (agent activ: peroximonosulfat de potasiu)

Companie farmaceutică și producător

Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH

Galgheide 8

D-48291 Telgte (Germania)

Denumirea produsului farmaceutic

Pulbere VIRUMOR (agent activ: peroximonosulfat de potasiu)

Aplicații

Medicamente pentru pești ornamentali de apă dulce și apă de mare, folosit în prevenirea și tratarea cu infecții bacteriene (*Aeromonas*, *Pseudomonas*, *Streptococcus*, *Columnaris* etc.), boli virale și infecții fungice (*Saprolegnia*, *Achlya*). Simptomele vizibile ce apar în urma acestor infecții pot fi: pierderea pielii și a solzilor, balonare, zone de crăpături ale suprafeței pielii uneori foarte adânci, răni deschise cu sau fără înroșirea țesutului înconjurător, creșteri ulcerose, aripioare sfărâmate, mișcări letargice sau frenetice, mișcări de clătinare, spasme, colorația se întunecă în nuanță, solzi proeminenți în zona abdomenului, smocuri asemănătoare cu vata.

Contraindicații și efecte secundare

Nu se cunosc contraindicații sau efecte secundare. Dacă observați reacții adverse la pești dumneavoastră ornamentali, vă rugăm să informați medicul veterinar sau farmacistul.

Specii pentru care este destinat medicamentul

Pești ornamentali

Dozajul pentru fiecare specie, tipul și durata de aplicare

1. Tratament de baie pe termen lung:

Se dizolvă 500 mg de VIRUMOR pentru fiecare 100 l de apă și apoi se amestecă pentru a se distribui uniform în acvariu sau iaz de grădină, zilnic, timp de 7 zile. Hrăniți

numai cantități mici în timpul tratamentului. Dacă simptomele persistă, tratamentul poate fi repetat după o pauză de o zi.

2. Tratament de baie pe termen scurt:

Se dizolvă 500 mg de VIRUMOR pentru fiecare 10 l de apă și se lasă peștele să se înoate în această soluție timp de 3 ore. Asigurați o ventilație adecvată pe durata tratamentului și țineți peștii sub observație. Opreți imediat tratamentul dacă apar semne de intoleranță. Acest tratament poate fi repetat zilnic, la intervale de 24 de ore, până la o săptămână.

3. Baie de dezinfectare:

Se recomandă o baie de dezinfecție ca măsură de precauție pentru peștii ornamentali nou introduși în acvariu, pentru plantele acvatice și obiectele decorative nou achiziționate etc.

Se dizolvă 500 mg de VIRUMOR în 10 l de apă și se lasă peștii, plantele sau obiectele decorative în această soluție pentru 30 minute.

4. Acțiune preventivă regulată:

Ca și mod de prevenire, în mod regulat, se poate adăuga săptămânal 100 mg pentru fiecare 100 l de apă, astfel se va reduce considerabil riscul apariției unor posibile infecții.

Precauții speciale pentru depozitare

- Păstrați VIRUMOR într-un loc uscat și întunecat. A se păstra în ambalajul original.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Important

- VIRUMOR nu este indicat pentru nevertebrate. Melcii, midiile, creveții etc. trebuie să fie excluși din tratament.
- Indicat pentru pești ornamentali. Nu utilizați pe organisme care sunt folosite pentru a obține hrană.
- VIRUMOR nu poate fi utilizat împreună cu alte produse.
- A nu se utiliza după expirarea termenului limită.

Precauții speciale pentru eliminarea produselor farmaceutice neutilizate

Luați produsele medicale neutilizate și recipientele neterminate de produse medicale la punctele de colectare desemnate.

Data ultimei revizuirii a prospectului

2019-11-25