vnejsi str.

Pregatirea soluției pentru aplicare:
Cantitatea de produs necesar, se măsoară după amestecarea completă a conținutului ambalajului original. Se toarnă cantitate măsurată într-un rezervor sau flacon cu pulverizare pe jumătate plin cu apă se agită ușor și pe urmă se completează până la volum. Se prepară numai cantitatea de lichid ce se v-a consuma. O mișcare ușoară a rezervorului sau a flaconului păstrează emulsia într-o formă stabilă. În cazul în care s-a preparat lichidul dar timp de 30 minute înca nu se foloseste (de exemplu, amânarea începerii aplicației) stabilitatea fizică a emulsiei este de 99 % din valoarea sa inițială. În acest timp, se recomandă din când în când agitarea rezervorului cu ușurință.

Curățarea dispozitivului folosit:
După aplicarea soluției este necesară golirea rezervorului sau a flaconului de pulverizare și toate echipamentele folosite se pun la spălat. Este interzis golirea reziduurilor rămase în vecinătatea resurselor de apă, a apelor subterane și de suprafață sau în recipiente cu apă.

Precauții:
Echipamentele de protecție personală pentru pregătirea și aplicarea preparatului

Mască de protecție:	nu este necesar
Protecția mâinilor:	mănuși din cauciuc sau material plastic
Protecția ochilor și a feței:	ochelari de protecție
Protecția corpului:	îmbrăcăminte de protecție din material textil
Protectia capului:	nu este necesar
Protectia picioarelor:	nu este necesar

În timpul utilizării produsului nu mâncați, nu beți sau fumați și, de asemenea, nici după terminarea lucrului,până când nu dați jos echipamentul de protecție. Îmbrăcăminte de protecție înainte de a fi utilizate din nou, trebuiesc spălate sau curățate.

RockEffect_RO_navod_190916_1434

Informații privind primul ajutor:

Informații generale:	În caz de probleme de sănătate aparente sau în caz de indoiala cereti sfatul medicului și să-i oferiți informații cu privire la etichetă / etichetă sau ambalaj al produsului/
Primul ajutor în caz de inhalare:	Se întrerupe activitatea. A se depărta de mediul contaminat.
Primul ajutor în caz de contact cu pielea:	Se spală pielea cât mai mult posibil cu apă caldă și săpun.
Primul-ajutor in caz de contact cu ochii:	clătiți cu apă curată și pe cât posibil calduță, se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul. Lentilele se aruncă.

Primul ajutor în caz de ingerare accidentală:
clătiti-vă gura, eventual beți un pahar de apă (aproximativ ¼ litru). Nu se va provoca voma.

În caz că se cere ajutorul medicului, el trebuie informat de preparat cu care sa lucrat și condițiile de prim ajutor. Următoarele etape de prim ajutor (o eventuală terapie) pot fi consultate cu Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar luni-vineri, orele 8.00 - 15.00

Depozitare:
A se păstra în ambaljul original, sigilat, in depozite uscate si ventilate, la temperaturi de la +5 la +30 °C, separat de alimente, furaje, îngrășăminte, dezinfectanți și ambalajele acestor substanțe. Protejați de îngheț, de căldură radiantă, flăcări deschise și lumina directă a soarelui.

Metodă sigură pentru eliminarea restului de preparat neutilizat, a ambalajelor:
Ambalajul nu trebuie să fie reutilizat în nici un alt scop. Soluția o pregăți întotdeauna în cantitățile necesare, nu pentru stocare. Preparatul nefolosit (în ambalajul original), recipientul golit, clătit cu apă și distrugeți ca un deșeu periculos. Reziduri lichide, după diluarea 1:5 a se pulveriză pe parcelă tratată, dar a nu se afecta resursele de apă subterană sau apele de suprafață.
Ambalajul produsului a nu se arunca în foc.

Calendar de apariție a dăunătorilor și recomandări de protecție



Produs auxiliar de protecție a plantelor pentru utilizatori neprofesioniști

ROCK EFFECT

UTILIZAREA ÎN GRADINĂ ȘI ÎN AFARA GRĂDINII ESTE PERMISĂ

Un preparat sub formă concentrată emulsionabilă destinată pentru sporirea rezistenței și a capacității de protecție a plantelor împotriva dăunătorilor.

Caracteristica produsului: produsul îmbunătățește sănătatea plantelor, crește rezistența și imunitatea plantelor împotriva dăunătorilor, reduce atractivitatea plantelor la dăunători și prin urmare și prezența dăunătorilor pe plantele tratate.

Substanța activă: ulei din *Pongamia pinnata* - 868,5 g / *l*

Substanțe periculoase pentru sănătate, care contribuie la clasificarea preparatului: nerelevante

Producătorul produsului:	AGRO CS a.s., filiala Bezděkov 13, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 972 292
Distribuitor în România:	AGRO CS ROMANIA S.R.L., Mândra 57B, județ Brașov, www.agrocs.ro
Distribuitor în R. Moldova:	SRL "FRUCTUL", str. Chicera nr. 11, com. Truşeni, mun. Chișinău, Republica Moldova, www.fructul.md

Conținutul și tipul ambalajului:
HDPE și PET sticle într-o cutie de carton imprimat cu -100 ml

Data de producție / numărul lotului: menționat pe ambalaj

Termenul de valabilitate: menționat pe ambalaj

vnitrni str.

MARCARE:

• P102 A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. • P264 SPĂLAȚI-VĂ BINE DUPĂ UTILIZARE. • P270 A NU MÂNCA, BEA SAU FUMA ÎN TIMPUL UTILIZĂRII PRODUSULUI. • P280 PURTAȚI MĂNUȘI DE PROTECȚIE/ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE/ECHIPAMENT DE PROTECȚIE A OCHILOR/ ECHIPAMENT DE PROTECȚIE A FEȚEI. • P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: SPĂLAȚI CU MULTĂ APĂ ȘI SĂPUN. • P332 + P313 ÎN CAZ DE IRITARE A PIELII: CONSULTAȚI MEDICUL.

• EUH 401 PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE.

• RISCUL CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PREPARATULUI, ÎN CONFORMITATE CU DOZA PRESCRISĂ SAU DE CONCENTRARE ESTE PENTRU PIAȚA INTERNĂ, FERMĂ ȘI ANIMALE SĂLBATICE RELATIV ACCEPTABILĂ. • RISCUL CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PREPARATULUI, ÎN CONFORMITATE CU DOZA PRESCRISĂ SAU CONCENTRAȚIA ESTE ACCEPTABILĂ PENTRU PĂSĂRI. • PENTRU PEȘTI ȘI ALTE ANIMALE ACVATICE ESTE OTRĂVITOR. • PREPARATUL NU ESTE ANALIZAT PENTRU RĂME ȘI ALTE MACROORGANISME DIN SOL. • PREPARATUL PENTRU ALBINE SUB FORMĂ CU RISC ACCEPTABIL ÎN CONFORMITATE CU DOZA • PRESCRISĂ SAU DE CONCENTRARE. • PREPARATUL ESTE PENTRU POPULAȚIILE ALTOR INSECTE BENEFICE CU RISC ACCEPTABIL.

• SP1 A NU SE POLUA APA CU ACEST PRODUS SAU CU AMBALAJUL LUI. A NU SE CURĂȚA DISPOZITIVUL DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ. ÎMPIEDICARE A CONTAMINĂRII PRIN CANALE DE SCURGERE AGRICOLE,CURȚI ȘI DRUMURI.

• NU LĂSAȚI LA LA ÎNDEMÂNA ANIMALELOR. • INTERZICEREA UTILIZĂRII ÎN PRIMA ZONĂ DE PROTECȚIE A SURSELOR DE APĂ POTABILĂ. • ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL, CITIȚI CU ATENȚIE MANUAL DE INSTRUIRE! • AVEȚI GRIJĂ,CA PREPARATUL ÎN NICI UN CAZ SĂ NU AFECTEZE RESURSELE DE APĂ SUBTERANĂ SAU DE SUPRAFAȚĂ.

Perioada de valabilitate:
În cazul menținerii condițiilor de depozitare în ambalajul original sigilat 36 luni de la data fabricației. După durata de viață utilă a produsului nu poate fi comercializat.

AGRO CS

Modul de acționare:
Prin aplicarea produsului auxiliar ROCK EFFECT se îmbunătățește sănătatea plantelor și rezistența la dăunători. Datorită conținutului substanței active în produsul Rock effect, reduce atractivitatea plantelor la dăunători și prin urmare și prezența dăunătorilor pe plantele tratate este redusă. Această caracteristică a uleiului determină compoziția sa naturală, în special substanță karanjin și pongamia. Plantele sunt ferite de deteriorări dăunătorilor erbivori. Acest lucru îmbunătățește aspectul, sănătatea și imunitate.

Mod de utilizare:

Planta	Motivul de utilizare	Dozarea	Durata de protecție	Notă
roșii	mărimea rezistenței plantelor	1-3 % (100-300 ml / 10 l apă)	-	
plante ornamentale	mărimea rezistenței plantelor	1-3 % (100-300 ml / 10 l apă)	-	
ardei	mărimea rezistenței plantelor	50-150 ml 5 l apă / 100m^2 (1-3 %)	-	
castraveți	mărimea rezistenței plantelor	50-150 ml 5 l apă / 100m^2 (1-3 %)	-	
dovlecei	mărimea rezistenței plantelor	50-150 ml 5 l apă / 100m^2 (1-3 %)	-	
fasole	mărimea rezistenței plantelor	50-150 ml 5 l apă / 100m^2 (1-3 %)	-	
semințoase	mărimea rezistenței plantelor	3 % (300 ml / 10 l apă)	-	
sâmburoase	mărimea rezistenței plantelor	3 % (300 ml / 10 l apă)	-	
semințoase, sâmburoase	mărimea rezistenței plantelor	1-3 % (100-300 ml / 10 l apă)	-	
viță de vie	mărimea rezistenței plantelor	3 % (300 ml / 10 l apă)	-	
agreșe cu excepția plantelor foarte tinere	mărimea rezistenței plantelor	1-3 % (100-300 ml / 10 l apă)	-	
agreșe,coacăze cu excepția plantelor foarte tinere	mărimea rezistenței plantelor	1-3 % (100-300 ml / 10 l apă)	-	
conifere cu excepția plantelor foarte tinere	mărimea rezistenței plantelor	1-3 % (100-300 ml / 10 l apă)	-	

Perioada de protecție (zile) este disponibilă într-un interval mai scurt între ultimul tratament și recoltă (roșii, ardei, castraveți, dovlecei, fasole, agrișe, coacăze,semințoase, sâmburoase, viță de vie și hamei), sau care se ocupă cu lăstările (plante ornamentale, conifere).

Instrucțiuni pentru aplicare:
Aplicarea prin pulverizare sau prin stropire

Doza pentru ardei, castraveți, dovlecei și fasole este stabilită pentru utilizarea la nivel de suprafață; dacă se tratatează lăsturile neînrădăcinate cu distanțe mari, este necesar să se ajusteze doza pe suprafața efectiv tratată. Înainte de a folosi produsul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Riscul prezentat de un produs pentru utilizator, este acceptabil atâta timp cât perioada totală de lucru cu produsul nu depășește 30 de minute într-o singură zi. Tratamentul poate fi repetat în aer liber după spălarea filmului protector de pe plantă prin ploaie sau rouă maxim 5x, în interior după terminarea acționării maxim 1x.

1) Roșii, ardei, castraveți, dovleci
creșterea rezistenței plantelor împotriva afidelor, musculițelor albe, acarienilor și al păduchilor; numărul maxim de tratare de 5x în timpul vegetației.

2) Plante ornamentale
creșterea rezistenței plantelor împotriva afidelor, musculițelor albe, carienilor, păduchilor și viermilor; numărul maxim de tratare de 5x pe an.

3) Fasole
crește rezistența plantelor împotriva afidelor și păduchilor; numărul maxim de tratare de 5x în timpul vegetației.

4) Semințoase
dăunători ce supraviețuiesc iarna; de la începutul încoltirii mugurilor verzi; numărul maxim de tratare de 1x în timpul vegetației.

5) Sâmburoase
dăunători ce supravietuiesc iarna; numărul maxim de tratare de 1x în timpul vegetației.

6) Semintoase, sămburioase
crește rezistența plantelor împotriva afidelor și acarienilor; în cazul detectării apariției; numărul maxim de tratare de 5x pe an.

7) Viță de vie
dăunători ce supraviețuiesc iarna; la încolțire; numărul maxim de tratare de 1x pe an.

8) Agrișe, coacăze, cu excepția plantelor foarte tinere
creșterea rezistenței plantelor împotriva afidelor; la apariția; numărul maxim de tratare de 5x în timpul vegetației.

9) agrișe, coacăze, cu excepția plantelor foarte tinere
creșterea rezistenței plantelor împotriva mucegaiului agrișe american; 1x înainte de înflorire, după înflorire de 4x, coacăze pot fi tratate numai după înflorire; numărul maxim de tratare de 5x în timpul vegetației.

10) Coniferele
crește rezistența plantelor împotriva dăunatorilor la conifere; la apariția; În cazul utilizării împotriva dăunitorilor la conifere pentru o acțiune optimă,tratarea trebuie repetata repetată la o săptămână; numărul maxim de tratare de 5x în timpul vegetației.

Notele de aplicare:
Preparatul ROCK EFFECT este indicat pentru crestea rezistenței plantelor și imunității împotriva dăunătorilor. Din moment ce este un produs pe bază naturală, turbiditatea sau sedimente nici un dăunător și nu afectează eficacitatea produsului. Concentrație mai scăzută a lichidului aplicabil în intervalul adecvat pentru plantele tinere, concentrație mai mare pentru plante mature și pentru plante mai puternic atacate de organismele dăunătoare. Preparatul se aplică pe frunzele plantelor prin udare sau pulverizare de la o distanță de min. 30 cm. ROCK EFECT acționează prin contact, deaceea este mai bine pentru eficiența necesară tratarea părților plantei care sunt atacate de dăunători (ruperea frunzelor atacate). Pentru o eficiență optimă, este necesar să se aplice la constatarea primei apariții a dăunătorilor. Pulverizarea sau stropirea se efectuează până la umezeală, cel târziu când începe lichidul aplicat să se scurgă de pe suprafața părților tratate ale plantelor. A se evita umezirea excesivă a plantei. A se evita lumina solară directă în timpul aplicării. Nu recomandăm folosirea prodului auxiliar la plante foarte tinere. Înainte de a utiliza produsul este recomandat să se încerce pe o cantitate mai mica de plante care urmează să fie tratate din cauza posibilei sensibilității a soiului.

rozměr návodu: 316 x 115 mm

datum: 16.9.2019	název přípravku:	**Rock effect** návod RO
	kód archiv:	RockEffect_RO_navod_190916_1434
	velikost GHS symbolů	
poznámky:	**M 1:1**	Preklad SK etikety - schválená: 25.4.2016