

KOLLANT BRODY 2.5 PASTE

Momeală rodenticidă gata de utilizare sub forma de pastă proaspătă

PENTRU UTILIZATORI NEPROFESIONIȘTI

PENTRU UTILIZARE IN INTERIOR SI EXTERIOR

COMPOZIȚIE

100 grame de produs conține:

Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0) g 0,0025

Denatonium Benzoate (N° CAS 3734-33-6) g 0,001

Coformulanți și substanțe atractive q.b. a g 100



ATENȚIE

INDICAȚII DE PERICOL

H 373 Poate provoca leziuni ale organelor (sângelui) prin expunere prelungită sau repetată.

INDICAȚII DE PRECAUȚIE

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P301 + P310** – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. **P308 + P313** – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P501 - Aruncați conținutul și recipientul în spații special amenajate (deseuri) conform reglementărilor naționale.

PRODUS BIOCID (TP 14)

AVIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCID

RO/2019/0255/MRA/IT/2017/00433/AUT

Titularul Autorizației

KOLLANT S.r.l., Via Trieste 49/53 PADOVA

Tel. 049 9983000

Producător

KOLLANT S.r.l - via C. Colombo 7/7A - Vigonovo (VE)

Ambalaj: Punga plastic 150g, care conține momeală proaspătă în pliculețe de hârtie gata de utilizare de 10g fiecare.

Termen de valabilitate : 2 ani

Lot nr.: vezi stampila

INFORMAȚII PENTRU MEDIC

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de înghițire, simptomele care pot întârzia, pot include sângerări ale nasului sau gingiilor. În cazurile severe, se pot produce hematoame și sânge în fecale și urină.

Antidot: Vitamina K1 administrat numai de personal medical / veterinar.

În cazul:

Contactului cu pielea, spălați mai întâi pielea cu apă și apoi cu apă și săpun.

Contactului cu ochii, clătiți ochii cu apă sau soluție sterilă pentru clătirea ochilor, mențineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

Înghițire, clătiți bine gura cu apă. Nu dați nimic oral unei persoane inconștiente. Nu provocați vărsături.

În caz de înghițire, contactați imediat un medic și arătați-i recipientul sau eticheta produsului. Contactați un chirurg veterinar dacă produsul este înghițit de un animal de companie.

CARACTERISTICI TEHNICE

KOLLANT BRODY 2.5 PASTE este un rodenticid gata de utilizare sub forma de momeală proaspătă (pastă) pe bază de brodifacoum, substanță activă anticoagulantă extrem de eficientă împotriva șobolanilor și șoarecilor, chiar și după o singură administrare.

Produsul este deosebit de atractiv și plăcut pentru toate speciile de rozătoare pentru care este destinat utilizării.

Ambalajul primar în plicuri cu o singură doză îl face, de asemenea, extrem de practic.

Datorită modului cum este formulat, produsul nu creează suspiciuni în populația de rozătoare, menținându-și astfel gustul și proprietățile neschimbate. **KOLLANT BRODY 2.5 PASTE** conține o substanță amară pentru a preveni ingerarea accidentală de către copii.

KOLLANT BRODY 2.5 PASTE poate fi folosit în interiorul și în jurul clădirilor, cum ar fi, de exemplu, case, pivnițe, garaje, depozite și grădini private.

ORGANISME ȚINTĂ

Șoarecele de casă (*Mus musculus*), atât pentru populația tânără cât și pentru adulți.

Șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*), atât pentru populația tânără cât și pentru adulți.

MOD DE UTILIZARE

KOLLANT BRODY 2.5 PASTE este o momeală gata de utilizare sub formă de pastă proaspătă pentru a fi utilizată în recipiente pentru momeală protejată (stații de intoxicare) protejate de agenții atmosferici, de ingerarea speciilor nevizate și de dispersia în mediu.

INDICAȚII PENTRU UTILIZARE ȘI AVERTISMENTE

Înainte de utilizare, citiți și urmați instrucțiunile de pe ambalajul produsului, precum și informațiile care însoțesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de vânzare.

Luați în considerare și mecanisme de control ne-chimice (de exemplu, capcanele cu lipici) înainte de a utiliza produsele rodenticide cu substanțe anticoagulante.

Îndepărtați sursele de hrană ușor accesibile de la rozătoare (de exemplu, boabe de cereale sau resturi alimentare). De asemenea, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru perturbă nu numai populația rozătoarelor ci face mai dificilă acceptarea momelii..

Recipientele (Stațiile de intoxicare) cu momeală trebuie amplasate în imediata vecinătate a locurilor în care activitatea rozătoarelor a fost verificată anterior (de exemplu, alei, adăposturi pentru păsări , căile de acces pentru intrarea animalelor în grajduri, pivnițe etc.). Unde este posibil, fixați containerele cu momeală securizate pe teren sau pe alte structuri..

NU plasați produsul la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie, a animalelor de fermă și a altor animale nețintă.

Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de unelte sau suprafețe care pot intra în contact cu produsul.

Nu introduceți recipiente de momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei deoarece momeala poate intra în contact cu apa.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.

La sfârșitul perioadei de tratament, scoateți momelile sau recipientele rămase cu momeli.

Nu deschideți saculețul de hârtie care conține pasta proaspătă.

DOZE ȘI MOD DE UTILIZARE

Utilizarea în interiorul clădirilor Pentru controlul Șoarecelui de casă (*Mus musculus*).

Aplicați 20-40 g de momeală **KOLLANT BRODY 2,5 PASTE** în recipient (stația de intoxicare), egală cu 2-4 momeli pastă proaspătă pentru pliculețele care cântăresc 10 g fiecare.

În cazul în care avem o suprafață mai mare și sunt necesare mai multe containere (stații de intoxicare), acestea se plasează la o distanță de aproximativ 10-15 metri unul de celălalt dar în orice caz nu la mai puțin de 5 metri.

Containerele trebuie inspectate la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și apoi cel puțin săptămânal. Acest lucru este de a verifica integritatea containerului, consumul de momeală, și, eventual, pentru a elimina carcasele rozătoarelor. Când este necesar, completați momeala.

Utilizarea în interiorul clădirilor Pentru controlul Șobolanului cenușiu (*Rattus norvegicus*)

Aplicați 100-200 g de **KOLLANT BRODY 2,5 PASTE** egală cu 10-20 momeli pastă proaspătă pentru pliculețele care cântăresc 10 g fiecare.

În cazul în care avem o suprafață mai mare și sunt necesare mai multe containere, acestea se plasează la o distanță de aproximativ 10-15 metri unul de celălalt dar în orice caz nu la mai puțin de 5 metri.

Recipientele trebuie inspectate la fiecare 5-7 zile la începutul tratamentului și apoi cel puțin săptămânal. Acest lucru este de a verifica integritatea containerului, consumul de momeală, și, eventual, pentru a elimina carcasele rozătoarelor. Când este necesar, completați momeala.

Utilizarea în exteriorul clădirilor Pentru controlul Șobolanului cenușiu (*Rattus norvegicus*)

Aplicați 100-200 g de **KOLLANT BRODY 2,5 PASTE** egală cu 10-20 momeli pastă proaspătă pentru pliculețele care cântăresc 10 g fiecare.

În cazul în care avem o suprafață mai mare și sunt necesare mai multe containere, acestea se plasează la o distanță de aproximativ 10-15 metri unul de celălalt dar în orice caz nu la mai puțin de 5 metri.

Poziționați recipientele cu momeală în zone care nu sunt expuse inundațiilor.

Înlocuiți momeala în recipiente dacă acestea sunt deteriorate de apă sau contaminate cu murdărie.

Containerele cu momeli trebuie verificate cel puțin la fiecare 5-7 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal

după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, recipientele sunt intacte și pentru a scoate corpurile rozătoarelor. Umpleți recipientul când este necesar.

MĂSURI DE PREVENIRE A RISCURILOR

Luați în considerare măsuri preventive de control pentru a încuraja consumul produsului și pentru a reduce riscul de re-infestare (de exemplu, împiedicați posibilele deschideri, eliminați cât mai mult posibil sursele potențiale de alimente și băuturi).

Nu utilizați rodenticide anticoagulante ca momeli permanente (de exemplu pentru a preveni orice infestare sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor).

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în decurs de 35 de zile. În cazul unei suspiciuni de ineficiență la sfârșitul tratamentului (de exemplu, putem observa în continuare activitatea rozătoarelor), cereți sugestii furnizorului de produse sau sunați la un serviciu de dezinsecție și deratizare.

Verificați dacă rozătoarele au murit și eliminațiile în timpul tratamentului, cel puțin cu aceeași frecvență ca și recipientele pentru momeală.

La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu legislația în vigoare. A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis și protejat de lumina directă a soarelui.

Depozitați într-un loc inaccesibil pentru copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.

ALTE INFORMAȚII

Datorită modului lor de acțiune întârziat, efectul rodenticidelor anticoagulante poate dura 4 până la 10 zile.

Rozătoarele pot fi purtători ai bolilor. Nu atingeți rozătoarele cu mâinile goale: pentru eliminare, utilizați mănuși sau unelte, cum ar fi cleștii.

Acest produs conține o substanță extrem de amară și un colorant.