

Informații și instrucțiuni privind utilizarea DACTYMOR FORTE (agent activ: ciromazină)

Companie farmaceutică și producător

Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH

Galgheide 8

D-48291 Telgte

Germania

Denumirea produsului farmaceutic

Soluție DACTYMOR FORTE (agent activ: ciromazină)

Aplicații

Tratamentul împotriva viermilor pielii (Gyrodactylus), trematodelor (Dactylogyrus) și teniei (Cestodes) la pești ornamentali de apă dulce și de apă marină. Infestarea cu trematode are ca rezultat o frecvență respiratorie crescută. Simptomul infecției cu tenie la pești este pierderea acută în greutate în ciuda hrănirii normale. Peștii care sunt infestați cu viermi de piele încearcă să scape ei înșiși de acești paraziți prin frecare și scărpinat.

Contraindicații și efecte secundare

Nu se cunosc contraindicații sau efecte secundare. Dacă observați reacții adverse la pești dumneavoastră ornamentali, vă rugăm să informați medicul veterinar sau farmacistul.

Specii pentru care este destinat medicamentul

Pești ornamentali

Dozajul pentru fiecare specie, tipul și durata de aplicare

Înlocuiți 25% din apa din acvariu, prin sifonare dacă este posibil, înainte de a începe tratamentul cu DACTYMOR FORTE.

Adăugați 5 ml = 100 picături de DACTYMOR FORTE pentru fiecare 100 l apă de acvariu și amestecați apa din acvariu pentru a dispersa produsul. Opriți lămpile UV. După 6 ore tratament este necesară înlocuirea a minimum 3/4 din apa din acvariu. În ziua următoare se schimbă jumătate din apa din acvariu. Un singur tratament este, în general, adecvat pentru viermii de piele și tenii. Cu toate acestea, ouăle trematode nu sunt afectate. Prin urmare, atunci când se tratează trematode, tratamentul trebuie repetat de două ori, așteptând aprox. o săptămână între tratamente (pentru pești ornamentali de apă rece, așteptați aproximativ o săptămână și jumătate între tratamente). Acvariul trebuie monitorizat continuu în timpul tratamentului cu DACTYMOR FORTE. În acvariile care conțin o biomasă mare (microorganisme din filtre, sol etc.) utilizarea DACTYMOR FORTE poate duce la o accelerare a creșterii bacteriene. La rândul său, acest lucru poate duce la o epuizare a oxigenului. Schimbați imediat apa din acvariu dacă există semne de turbiditate bacteriană sau se observă indicații de epuizare a oxigenului.

Indicații pentru depozitare

- Păstrați DACTYMOR FORTE într-un loc uscat, departe lumină directă. A se păstra în ambalajul original
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Important

- DACTYMOR FORTE nu este indicat pentru nevertebrate. Melcii, midiile, creveții etc. trebuie să fie excluși din tratament.
- Indicat pentru pești ornamentali. Nu utilizați pe organisme care sunt folosite pentru a obține hrană.
- A nu se utiliza după expirarea termenului limită.

Indicații speciale pentru eliminarea produselor farmaceutice neutilizate

Luați produse medicale neutilizate și recipiente neterminate de produse medicale la puncte de colectare desemnate.

Data ultimei revizuiți a prospectului

20.05.2020